

VEBIZOLFO WG

Zolfo micronizzato sotto forma di microgranuli idrodispersibili contro le forme di Oidio in frutticoltura, viticoltura, orticoltura e floricoltura.

Partita n°.....

Composizione – 100 gr. di prodotto contengono:

- ZOLFO puro (esente da selenio) g. 80
- Disperdenti, bagnanti q.b. a g. 100

Frasi di Rischio

R 38 Irritante per la pelle

Consigli di Prudenza

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini; S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; S 20/21 Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego; S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti; S 46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta



IRRITANTE

VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO SRL

Via Desman 43 - 35010 Borgoricco (PD)

Registrazione n. 12323 del 08/11/2004 del Ministero della Salute

Officina di produzione: AGROSTULLN GmbH - Werk Stulln, Werksweg 2 – D-92551 STULLN (Germania)

Officine di confezionamento: VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO srl – Via Desman 43 – Borgoricco (PD)

LIFA srl – Isola Vicentina (VI)

Taglie di confezione: Kg. 0,1-0,2-0,5-1-5-10-15-20-25

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE: In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO: riferite a 100 litri d'acqua

VITICOLTURA: trattamenti preventivi: gr. 200-400; trattamenti ad infezione da oidio avvenuta: gr. 400-500.

FRUTTICOLTURA: Pomacee: trattamenti prefiorali: gr. 200-500; in fioritura e postfiorali: gr. 200-300. Pesco, Susino, Ciliegio, Agrumi: gr.200-500.

ORTICOLTURA: patate, pomodoro, bietole, cavoli, fragole, cucurbitacee gr. 200-500.

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO: Kg. 8/Ha effettuando il primo trattamento alla comparsa dei sintomi ed effettuando i successivi ad intervalli di 15-20 giorni.

CEREALI: Kg. 8/Ha intervenendo alla comparsa della malattia sulle ultime due foglie del culmo.

GIRASOLE – SOIA – TABACCO: Kg. 4-8/Ha.

VIVAI DI PIOPPA: gr. 200-400.

COLTURE FLOREALI – ORNAMENTALI – FORESTALI: gr. 150-400 intervenendo ai primi sintomi della malattia.

Preparazione della poltiglia: mettere in un recipiente il quantitativo di prodotto necessario, aggiungere 1-2 lt di acqua per Kg di VEBIZOLFO WG e agitare fino ad ottenere un liquido cremoso che dovrà essere versato nella botte (con l'agitatore in funzione) entro 30 minuti dalla sua preparazione, quindi portare a volume con acqua mescolando bene.

COMPATIBILITA': Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese), con oli minerali, DNOC, Captano, DDVP, Binapacryl, Diclofluamide, Deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli oli minerali e del Captano. Non applicare su colture sofferenti o stressate. Mantenere sempre l'agitatore in funzione.

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITA': VEBIZOLFO WG può arrecare danno alle seguenti cultivars di: MELE: Black Ben Davis – Black Stayman – Calvillia Bianca – Commercio – Golden delicious – Jonathan – Imperatore – Renetta – Rome Beauty – Stayman Red- Winesap.

PERE: Buona Luigia D'Avranches – Contessa di Parigi - Kaiser Alexander – Olivier de Serres – William - Decana del Comizio.

VITE: Sangiovese. CUCURBITACEE: Può essere fitotossico.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 5 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.